	Population concernée	Schéma de vaccination	Sérologies pré et post vaccinales	Délai avant grossesse	Pendant la grossesse	En post partum
dTcaPolio*	Toutes les femmes	1 injection à l'âge adulte ≥ 2 ans après dTPolio		Non défini	Contre-indiqué	Si non à jour avant
ROR **rougeole oreillons rubéole**	Femmes nées depuis 1980 Quels que soient les antécédents vis à vis des 3 maladies	2 doses au total		1 mois	Contre-indiqué Si injection faite accidentellement, pas d'indication à une IMG	Si sérologie négative ou inconnue, 1 injection à faire immédiatement après l'accouchement
	Femmes nées <1980 non vaccinée Avec projet de grossesse	1 dose	Inutiles Si sérologie rubéole faite et positive : vaccination inutile. Si 2 injections faites, inutile de revacciner même si sérologie négative.			
Varicelle	Femme sans antécédent clinique de varicelle	2 doses	Pré vaccinale possible Post vaccinale inutile	1 mois	Contre-indiqué	Si pas d'antécédent clinique de varicelle (ou histoire clinique douteuse)
Grippe saisonnière	Toutes les femmes enceintes	1 dose			Quel que soit le trimestre de la grossesse	

***dTcaPolio : diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite.**

Source : Recommandations vaccinales 2013 du HCSP

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	**Vérification**	**Approbation**
Claire DE VIENNE Equipe Gynécologie Obstétrique - CHU\POLE FEMME ENFANT 28/07/2013 22:58:55	*Michel DREYFUS* Chef de Service - CHU 29/07/2013 16:40:50	*Lara VINAUGER* Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE EVALUATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 29/07/2013 16:42:03

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.