

1. OBJET

Décrire les modalités du soin de cordon chez un nouveau-né en salle de naissance puis en suite de naissance, avec pour but :

- de favoriser une chute rapide du cordon et une bonne cicatrisation,
- de prévenir l'infection du cordon, l'omphalite et ses complications.

2. DOMAINE D'APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE

Maternité - Salle de naissance et Suites de naissance

Professionnels de santé prenant en charge le nouveau-né : auxiliaire de puériculture, aide-soignante, pédiatre, sage-femme

3. RESPONSABILITES

Cadre responsable d'unité
EOHH

4. DESCRIPTION DE L'OBJET

En salle de naissance

- Utiliser un antiseptique lors de la section du cordon : Biseptine®
- Favoriser le plus rapidement possible le contact peau-à-peau car cela permet, entre autres, la colonisation du nouveau-né par des bactéries non pathogènes.

En suites de naissance

Les soins de cordon sont effectués jusqu'à la chute du cordon et la cicatrisation complète (absence d'écoulement ou suintement) :

- Systématiquement une fois par jour, au moment du bain ou au moment d'un change en l'absence de bain et également chaque fois qu'il y a présence de souillures sur le cordon : selles, urines, sérosités ...
 - Le soin est effectué par les parents du nouveau-né après éducation au soin lors du séjour en maternité ou en service de Néonatalogie.
- Il est recommandé de laisser le cordon hors de la couche (informer les parents).
 - Respect des précautions standard par les professionnels de santé, notamment désinfection des mains par friction hydro-alcoolique et port de gants si risque de contact avec des liquides biologiques.
 - Lavage des mains à l'eau et au savon pour les parents, séchage avec un essuie-main à usage unique.

- Utilisation de matériel dédié au nouveau-né (pas de partage entre nouveau-nés en maternité ou en néonatalogie) :
 - o Compresses non stériles en non-tissées.
 - o Savon doux liquide à pH neutre (flacon de savon liquide idéalement neuf, hypoallergénique, sans parfum, sans perturbateur endocrinien). Ne pas utiliser de pain de savon.
- Proscrire les carrés d'essuyage, les lingettes pré-imprégnées, les compresses réutilisables et les cotons-tiges.
- Aucun autre produit, type spray asséchant, huile, éosine ou antiseptique, ni lait maternel ne doit être appliqué sans avis médical.
- Retrait du clamp de Barr (ou Bahr) après 48 à 72h de vie dès qu'il a une apparence sèche, afin de faciliter les soins du cordon.

**Bonnes pratiques d'hygiène pour les soins du cordon aux nouveau-nés
en maternité et après la sortie de maternité**

SOINS DE CORDON DU NOUVEAU-NE		
Avant le soin	Pour le professionnel de santé: désinfection des mains avec un Produit Hydro-Alcoolique (PHA).	
	Pour les parents: lavage des mains avec un savon doux, rinçage à l'eau et séchage ou friction hydro-alcoolique (à la maternité).	
	Vérifier l'état du cordon : absence de pus, rougeur et gonflement.	
Déroulement du soin	Au moment du bain	En l'absence de bain
	Avant l'immersion dans l'eau, nettoyer le cordon avec une compresse non stérile en non tissée imbibée d'eau tiède et de savon. Puis rincer à l'eau pendant le bain.	Nettoyer le cordon avec une compresse non stérile en non tissée imbibée d'eau tiède et de savon. Rincer avec une ou plusieurs compresses non stériles en non tissées imbibées d'eau tiède jusqu'à élimination de toute trace de savon sur le cordon et sa base.
	En sortie du bain, sécher avec une serviette de toilette propre dédiée au bébé puis assurer un séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec une compresse non stérile en non tissée.	Assurer un séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec une compresse non stérile en non tissée.
	Vérifier l'absence d'humidité résiduelle. Vérifier l'absence d'érythème péri-ombilical ou de sécrétions purulentes.	
	Laisser le cordon à l'air HORS de la couche, sans compresse.	
Surveillance	A la maternité, tracer le soin, la surveillance et l'éducation thérapeutique des parents dans le dossier de l'enfant	

AVIS Relatif aux bonnes pratiques d'hygiène pour les soins du cordon pour les nouveau-nés en maternité et après la sortie de maternité
VD 18/01/2023 SF2H



[Vidéo] Comment réaliser le soin de cordon de retour à domicile (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=qMbdiKktu40>

Points de vigilance

La surveillance du cordon est quotidienne.

Les parents doivent être informés des signes infectieux d'alerte qui doivent amener à consulter :

- o Aspect inhabituel du cordon ou de la région péri-ombilicale
- o Cordon malodorant
- o Sécrétions purulentes
- o Érythème péri-ombilical

Prévenir le pédiatre de l'apparition de signes d'alerte.

Après la chute du cordon

Une fois le cordon tombé, il est recommandé de continuer les soins et le séchage durant encore quelques jours, le temps que la cicatrisation soit complète.

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES

AVIS Relatif aux bonnes pratiques d'hygiène pour les soins du cordon pour les nouveau-nés en maternité et après la sortie de maternité VD 18/01/2023 – SF2H

6. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

KTVO : cathéter veineux ombilical

7. DIFFUSION

Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom)

Equipe Gynécologie Obstétrique

8. EVALUATION

CYCLE DE VALIDATION

Rédaction	Vérification	Approbation
Melanie ALEXANDRE, Virginie HAZIZA, Carine LEHOUSSEL Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT, Cadre de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Infirmier(e) (IDE) - CHU\HYGIENE HOSPITALIERE 04 mai 2023 08:51:04, 04 mai 2023 12:47:56, 03 mai 2023 15:50:04	Christine DENOUAL ZIAD Chef de Service - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 06 mai 2023 23:45:42	Aurore BOUQUEREL (par Marc MANGIN) Directeur - CHU\DIRECTION DE LA QUALITE, GESTION DES RISQUES ET DES USAGERS 09 mai 2023 09:11:51